

ANGIO CT

Termin badania	
godz. zgłoszenia	

(ze względu na specyfikę badania, godzina może ulec opóźnieniu)

Informacje o badaniu:

Angio CT to badanie, które, pozwoli dokonać diagnostyki naczyń tętniczych, po dożylnym podaniu środka kontrastowego.

Badanie można wykonać w ramach umowy z NFZ oraz odpłatnie.

W przypadku badań finansowanych przez NFZ- wymagane skierowanie z Poradni Specjalistycznej.

Pacjenci rejestrowani w ramach umowy z NFZ zgłaszają się na ustaloną godzinę do Pracowni Tomografii Komputerowej.

W przypadku badań odpłatnych –wymagane jest zlecenie lub skierowanie od Lekarza Kierującego na badanie.

Pacjenci zarejestrowani na badanie odpłatne zgłaszają się do Recepcji SGL (III winda, I piętro) w celu uzupełnienia danych i dokonania płatności.

Przygotowanie do badania:

- Należy dostarczyć **prawidłowy** wynik poziomu **kreatyniny** oraz u osób z nadczynnością tarczycy wynik poziomu **TSH** (są to badania z krwi, ważne 2 tygodnie). Wyniki należy dostarczyć w wersji papierowej.
- Pacjenci leczeni preparatami Metforminy (METFORMAX, SIOFOR, GLUCOPHAGE, FORMETIC, METRAL, METIFOR, GLUFORMIN) powinni zaprzestać jej przyjmowania na 48 godz. przed i na 24 godz. po badaniu (pod kontrolą lekarza prowadzącego).
- Stosowanie leków przeciwkrzepliwych (Sintrom, Syncumar, Acenocumarol) oraz zastrzyków Heparyny podskórnej – proszę uzgodnić z lekarzem. Pozostałe leki bez zmian.
- Dzień przed badaniem wypić dodatkowo ok. 2 litra niegazowanych płynów (Pacjenci **dializowani** do decyzji nefrologa).

W dniu badania proszę zgłosić się **na czczo** - nie spożywać żadnych posiłków ani płynów.

Przed badaniem należy zgłosić personelowi choroby alergiczne, uczulenia na kontrast.

Wskazane jest posiadanie dokumentacji medycznej wcześniej wykonanych badań i zabiegów (karty informacyjne, opisy badań ultrasonograficznych, angiograficznych, tomografii komputerowej, konsultacji specjalistycznych) oraz listę zażywanych leków.

W trakcie badania należy zgłaszać personelowi jakiegokolwiek objawy niepożądane po podaniu dożylnego środka kontrastowego (duszność, zawroty głowy, nudności, świąd skóry, bóle w klatce piersiowej).

Po badaniu w celu łatwiejszego wydalenia środka kontrastowego z organizmu zalecane jest wypicie około 2,5 l wody niegazowanej lub napojów niesłodzonych w ciągu następujących 24 godzin.

W rzadkich przypadkach po badaniu z podaniem środka kontrastowego mogą pojawić się nudności, wysypka czy swędzenie. Wskazane jest jak najszybsze zgłoszenie tych objawów lekarzowi.

Pacjent pozostaje pod obserwacją przez ok. 20 min.

Odbiór wyników:

Czas oczekiwania na wynik jest do ok. 14 dni.

Dzwoniąc na nr **516 17 11 66** można uzyskać informację czy wynik jest już do odbioru .

Wynik można odebrać osobiście lub na podstawie pisemnego upoważnienia w Recepcji Głównej Szpitala (za Portierem) od poniedziałku do piątku w godzinach **8.00-16.00** (w czwartki do 18.00)

ANGIO CT

Dla pacjentów skierowanych przez Oddział Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Geriatrii

Termin badania	
godz. zgłoszenia do Recepcji	

(ze względu na specyfikę badania, godzina może ulec opóźnieniu)

Informacje o badaniu:

Angio CT to badanie, które, pozwoli dokonać diagnostyki naczyń tętniczych, po dożylnym podaniu środka kontrastowego.

Przygotowanie do badania:

- Należy dostarczyć **prawidłowy** wynik poziomu **kreatyniny** oraz u osób z nadczynnością tarczycy wynik poziomu **TSH** (są to badania z krwi, ważne 2 tygodnie). Wyniki należy dostarczyć w wersji papierowej.
- Pacjenci leczeni preparatami Metforminy (METFORMAX, SIOFOR, GLUCOPHAGE, FORMETIC, METRAL, METIFOR, GLUFORMIN) powinni zaprzestać jej przyjmowania na 48 godz. przed i na 24 godz. po badaniu (pod kontrolą lekarza prowadzącego).
- Stosowanie leków przeciwkrzepliwych (Sintrom, Syncumar, Acenocumarol) oraz zastrzyków Heparyny podskórnej – proszę uzgodnić z lekarzem. Pozostałe leki bez zmian.
- Dzień przed badaniem wypić dodatkowo ok. 2 litra niegazowanych płynów (Pacjenci **dializowani** do decyzji nefrologa).

Proszę zabrać przybory toaletowe, piżamę.

W dniu badania proszę zgłosić się **na czczo** - nie spożywać żadnych posiłków ani płynów.
Zażyc tylko leki przyjmowane na stałe.

Wskazane jest posiadanie dokumentacji medycznej wcześniej wykonanych badań i zabiegów (karty informacyjne, opisy badań ultrasonograficznych, angiograficznych, tomografii komputerowej, konsultacji specjalistycznych, oraz listę aktualnie zażywanych leków

Przed badaniem należy zgłosić personelowi choroby alergiczne, uczulenia na kontrast.

W trakcie badania należy zgłaszać personelowi jakiegokolwiek objawy niepożądane po podaniu dożylnego środka kontrastowego (duszność, zawroty głowy, nudności, świąd skóry, bóle w klatce piersiowej).

Po badaniu w celu łatwiejszego wydalenia środka kontrastowego z organizmu zalecane jest wypicie około 2,5 l wody niegazowanej lub napojów niesłodzonych w ciągu następujących 24 godzin.

W rzadkich przypadkach po badaniu z podaniem środka kontrastowego mogą pojawić się nudności, wysypka czy swędzenie. Wskazane jest jak najszybsze zgłoszenie tych objawów lekarzowi.

Sposób przygotowania do badania dostępny na stronie: www.bonifratrzy.krakow.pl

W celu rezygnacji lub zmiany terminu prosimy o informacje na numer 12/37 97 390 - badania płatne 12/37 97 377 - badania na NFZ , e-mail: informacja@bonifratrzy.krakow.pl