

## KOLONOSKOPIA BADANIE W GODZINACH 8:00-14:00

TERMIN BADANIA	
GODZINA ZGŁOSZENIA DO RECEPCJI	

(ze względu na specyfikę badania, godzina może ulec zmianie)

### Badanie można wykonać w ramach umowy z NFZ oraz odpłatnie.

Do wykonania badań w ramach umowy NFZ wymagane jest skierowanie z poradni specjalistycznej lub od lekarza rodzinnego. Podczas rejestracji pacjent otrzymuje informacje o badaniu oraz zgodę na przeprowadzenie badania do zapoznania się i wypełnienia w domu. Pacjenci rejestrowani na podstawie skierowania zgłaszają się 30 minut przed ustaloną godziną do Pracowni Endoskopii (II winda, 2 piętro).

Pacjenci rejestrowani odpłatnie zgłaszają się 30 minut przed ustaloną godziną do Recepcji SGL w celu dokonania płatności.

### OPIS BADANIA:

**Kolonoskopia** to badanie dolnego odcinka przewodu pokarmowego (jelita grubego) za pomocą kolonofiberoskopu, pozwalające ocenić błonę śluzową całego jelita grubego, co ma szczególnie znaczenie w profilaktyce i wczesnym rozpoznaniu chorób nowotworowych jelita grubego.

W miarę możliwości, na badanie należy zgłosić się z osobą towarzyszącą.

### PRZYGOTOWANIE DO BADANIA:

Badanie wykonuje się po odpowiednim przygotowaniu, polegającym na oczyszczeniu jelita grubego z resztek pokarmowych. W tym celu należy wykupić w aptece lek służący przygotowaniu do kolonoskopii—uwaga **konieczna jest recepta** od lekarza kierującego na badanie.

Najczęściej stosowane preparaty to wg kolejności alfabetycznej: **Citra Fleet, Eziclen, Fortrans, Moviprep, Olopeg.**

Decyzja o wyborze leku należy do lekarza i pacjenta, stosownie do ogólnego stanu zdrowia i ewentualnych chorób towarzyszących.

- na 4 dni przed planowaną kolonoskopią nie należy spożywać chleba gruboziarnistego, owoców ani warzyw pestkowych (np. ogórki, pomidory, winogrona, mak, kiwi, truskawki);
- w dniu poprzedzającym badanie:
  - zjeść lekkie śniadanie a na obiad zupeł (bulion)—ostatni posiłek;
  - w godz. 15:00–23:00 należy wypić zalecony środek wg załączonej do niego ulotki;
- w dniu badania:
  - pić płyny czyste, niegazowane;
  - nic nie jeść;
  - przed badaniem można zażyć własny lek przeciwbólowy/wg potrzeby

Jeśli jelito nie jest odpowiednio przygotowane można wykonać badanie w krótszym odcinku (np. sigmoidoskopię) lub odstąpić od wykonania badania (koszt zużycia sprzętu w przypadku badań odpłatnych pokrywa pacjent).

Jeśli pacjent zażywa leki obniżające krzepliwość, należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym na tydzień przed badaniem, celem odstawienia tych leków lub ich zamiany. W tej sytuacji może być konieczne wykonanie INR lub innych wskaźników układu krzepnięcia—stosownie do zaleceń lekarza prowadzącego. Osoby chorujące na cukrzycę powinny dodatkowo skonsultować z lekarzem sposób przygotowania.

**LEKI:** Jeśli na stałe zażywasz leki należy przyjąć poranną dawkę leków.

**WYNIKI:** Opis badania pacjent otrzymuje po wykonanej kolonoskopii. Wynik ewentualnego badania hist-pat można odebrać do 14 dni roboczych (jeżeli jest wykonywane). Pod nr tel. 516 171 166 można uzyskać informację czy wynik badania hist-pat jest już do odbioru.

Wynik hist-pat można odebrać **osobiście** lub na podstawie **pisemnego upoważnienia** w Recepcji Głównej Szpitala (przy wejściu głównym) od pon. do piąt. w godz. 8:00-15:00 (w czw. do 18:00).

Sposób przygotowania do badania dostępny na stronie: [www.bonifratrzy.krakow.pl](http://www.bonifratrzy.krakow.pl)

W celu rezygnacji lub zmiany terminu prosimy o informacje na numer:

tel. 12 37 97 390-badania płatne / tel. 12 37 97 377-badania na NFZ

e-mail: [informacja@bonifratrzy.krakow.pl](mailto:informacja@bonifratrzy.krakow.pl)