

KOLONOSKOPIA W ZNIECZULENIU OGÓLNYM

TERMIN BADANIA	
GODZINY ZGŁOSZENIA DO RECEPCJI	

(ze względu na specyfikę badania, godzina może ulec zmianie)

INFORMACJA O BADANIU:

Kolonoskopia to badanie dolnego odcinka przewodu pokarmowego (jelita grubego) za pomocą kolonofiberoskopu, pozwalające ocenić błonę śluzową całego jelita grubego, co ma szczególnie znaczenie w profilaktyce i wczesnym rozpoznaniu chorób nowotworowych jelita grubego. Na badanie należy zgłosić się z osobą towarzyszącą. Pacjent przez 12 godz. po badaniu nie może prowadzić pojazdu mechanicznego, pracować na wysokości, podpisywać ważnych dokumentów.

W celu rejestracji i uzupełnienia danych, należy zgłosić się do Recepcji Głównej Szpitala (przy wejściu głównym). Badanie wykonywane jest w Pracowni Endoskopii (II winda, 2 piętro), należy zgłosić się 20 min. wcześniej.

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA:

Zabrać ze sobą dowód osobisty, podkoszulek z krótkim rękawem, pantofle.

Badanie wykonuje się po odpowiednim przygotowaniu, polegającym na oczyszczeniu jelita grubego z resztek pokarmowych.

W tym celu należy wykupić w aptece lek służący przygotowaniu do kolonoskopii-uwaga **konieczna jest recepta** od lekarza kierującego na badanie.

Najczęściej stosowane preparaty to wg kolejności alfabetycznej: **Fortrans, Citra Fleet, Eziclen, Moviprep, Olopeg**. Wybór leku należy do lekarza i pacjenta, stosownie do ogólnego stanu zdrowia i ewentualnych chorób towarzyszących.

- na 4 dni przed planowaną kolonoskopią nie należy spożywać chleba gruboziarnistego, owoców ani warzyw pestkowych (np. ogórki, pomidory, winogrona, mak, kiwi, truskawki);
- w dniu poprzedzającym badanie: zjeść lekkie śniadanie, a na obiad zupę (bulion)-ostatni posiłek przed badaniem, w godz. 15:00 - 23:00 należy wypić zalecony środek wg załączonej do niego ulotki;
- w dniu badania: nic nie jeść i nie pić;

Jeśli jelito nie jest odpowiednio przygotowane, co uniemożliwi wykonanie badania kolonoskopii, lekarz może odstąpić od wykonania badania lub wykonać badanie na krótszym odcinku jelita /np. sigmoidoskopia/. Koszt zużycia sprzętu pokrywa w tym przypadku pacjent. Osoby chorujące na cukrzycę powinny dodatkowo skonsultować z lekarzem sposób przygotowania.

Do znieczulenia ogólnego wskazane jest wykonanie badania EKG, morfologii i jonogramu.

LEKI: Pacjent zażywający leki obniżające krzepliwość, musi skonsultować się z lekarzem prowadzącym, celem odstawienia tych leków, lub ich zamiany-może być konieczne wykonanie badania INR lub innych wskaźników układu krzepnięcia-zależnie od zaleceń lekarza prowadzącego. W dniu badania leki przyjmowane na stałe należy zażyć, popijając niewielką ilością wody.

WYNIKI: Opis badania pacjent otrzymuje po wykonanej kolonoskopii, natomiast wynik ewentualnego badania hist-pat można odebrać po 14 dniach roboczych (o ile było wykonywane).

Pod nr tel. 516 17 11 66 można uzyskać informację czy wynik badania hist-pat jest już do odbioru.

UWAGA!

Wynik hist-pat można odebrać **osobiście** lub na podstawie **pisemnego upoważnienia** w Recepcji Głównej Szpitala (przy wejściu głównym) od poniedziałku do piątku w godzinach **8:00-15:00** (w czwartki do 18:00).

Sposób przygotowania dostępny na www.bonifratrzy.krakow.pl

W celu rezygnacji lub zmiany terminu prosimy kontaktować się na numer 12 37 97 377