

**GASTROSKOPIA I KOLONOSKOPIA (PAKIET) W ZNIECZULENIU OGÓLNYM**  
**BADANIE WYKONYWANE JEST TYLKO ODPŁATNIE**

<b>TERMIN BADANIA</b>	
<b>GODZINA ZGŁOSZENIA DO RECEPCJI</b>	

(ze względu na specyfikę badania, godzina może ulec zmianie)

**Gastroskopia** jest to badanie pozwalające ocenić błonę śluzową przetyku, żołądka i dwunastnicy.

**Kolonoskopia** to badanie dolnego odcinka przewodu pokarmowego (jelita grubego) za pomocą kolonofiberoskopu, pozwalające ocenić błonę śluzową całego jelita grubego, co ma szczególnie znaczenie w profilaktyce i wczesnym rozpoznaniu chorób nowotworowych jelita grubego.

Na badanie należy zgłosić się z osobą towarzyszącą. Pacjent przez 12 godzin od znieczulenia nie może prowadzić pojazdu mechanicznego, pracować na wysokości, podpisywać ważnych dokumentów.

Pobranie wycinka hist-pat jest dodatkowo płatne wg cennika. W celu uzupełnienia danych i dokonania płatności na 30 minut przed badaniem, należy zgłosić się **do Recepcji SGL (III winda, 1 piętro)**.

**PRZYGOTOWANIE DO BADANIA:**

Zabrać ze sobą dowód osobisty, podkoszulek z krótkim rękawem, pantofle, szlafrok.

Badanie wykonuje się po odpowiednim przygotowaniu, polegającym na oczyszczeniu jelita grubego z resztek pokarmowych. W tym celu należy wykupić w aptece lek służący przygotowaniu do kolonoskopii—uwaga **konieczna jest recepta** od lekarza kierującego na badanie. Najczęściej stosowane preparaty to wg kolejności alfabetycznej: **Fortrans, Citra Fleet, Eziclen, Moviprep, Olopeg**.

Wybór leku należy do lekarza i pacjenta, stosownie do ogólnego stanu zdrowia i ewentualnych chorób towarzyszących.

- na 4 dni przed planowaną kolonoskopią nie należy spożywać chleba gruboziarnistego, owoców ani warzyw pestkowych (np. ogórki, pomidory, winogrona, mak, kiwi, truskawki);
- w dniu poprzedzającym badanie: zjeść lekkie śniadanie, a na obiad zupę (bulion)—ostatni posiłek przed badaniem, w godz. 15:00–23:00 należy wypić zalecony środek wg załączonej do niego ulotki;
- w dniu badania: nic nie jeść i nie pić;

Jeśli jelito nie jest odpowiednio przygotowane, co uniemożliwi wykonanie badania kolonoskopii, lekarz może odstąpić od wykonania badania lub wykonać badanie na krótszym odcinku jelita (np. sigmoideoskopię)—koszt zużycia sprzętu w przypadku badań odpłatnych pokrywa pacjent.

Osoby chorujące na cukrzycę powinny dodatkowo skonsultować z lekarzem sposób przygotowania.

Do znieczulenia ogólnego wskazane jest wykonanie badania EKG, morfologii i jonogramu, a kilka dni przed badaniem, wyniki skonsultować z lekarzem rodzinnym.

**W przypadku braku w/w badań proszę zgłosić się godzinę wcześniej na Oddział Diagnostyczno–Lecznicy, gdzie można wykonać te badania za opłatą wg obowiązującego cennika.**

**LEKI:**

Pacjent zażywający leki obniżające krzepliwość, powinien skonsultować się z lekarzem prowadzącym, celem odstawienia tych leków, lub ich zamiany—może być konieczne wykonanie badania INR lub innych wskaźników układu krzepnięcia, stosownie do zaleceń lekarza prowadzącego.

W dniu badania leki przyjmowane na stałe należy zażyć, popijając niewielką ilością wody.

**WYNIKI:**

Opis badania pacjent otrzymuje od razu po wykonaniu gastroskopii/kolonoskopii, natomiast wynik badania hist-pat (jeżeli jest wykonywany), po 14 dniach roboczych.

Pod nr tel. **516 171 166** można uzyskać informację czy wynik badania hist-pat jest już do odbioru.

**UWAGA!**

Wynik hist-pat można odebrać **osobiście** lub na podstawie **pisemnego upoważnienia** w Recepcji Głównej Szpitala (przy wejściu głównym) od pon. do piąt. w godz. **8:00-15:00** (w czw. do 18:00).

Sposób przygotowania dostępny na [www.bonifratrzy.krakow.pl](http://www.bonifratrzy.krakow.pl)

**W celu rezygnacji lub zmiany terminu prosimy kontaktować się na nr tel. 12 37 97 390**